

TEMA D'INTERÈS: NOU CALENDARI DE VACUNACIONS

En el DOGC 8035, de 3 de gener de 2020, va sortir publicada l'Ordre SLT/236/2019, de 19 de desembre, per la qual s'actualitza el calendari de vacunacions, on es modifiquen les recomanacions de vacunació contra la malaltia meningocòccica als 11-12 anys.

En el nou calendari *es substitueix als 11-12 anys (6è de primària) la vacuna anti-meningococ C conjugada per la vacuna antimeningocòccica conjugada tetravalent.*

També es vacunarà amb aquesta vacuna, durant dos cursos escolars, als alumnes de 2on ESO; i s'iniciarà la vacunació de tots els joves de 15 a 18 anys en els centres de salut.

Aquesta vacuna no afecta l'administració de la vacuna als nadons de 4 i 12 mesos, als quals se'ls continua administrant la vacuna antimeningococ C conjugada.

Podeu trobar aquesta ordre a la web col·legial – *Serveis al col·legiat – Normativa vigent – Vacunes.*

Calendari de vacunacions sistemàtiques 2020											
	Diftèria Tètanus Tos ferina	Polio- mielitis	Malaltia per <i>Haemophilus influenzae b</i>	Hepatitis B	Malaltia per meningococ	Hepatitis A	Xarampió Rubèola Parodititis	Infecció pel virus del papil·loma humà	Varicel·la	Grip	Malaltia per pneumococ
2 mesos	Hexavalent										Contra el pneumococ conjugada
4 mesos	Hexavalent				Contra el meningococ C conjugada						Contra el pneumococ conjugada
11 mesos	Hexavalent										Contra el pneumococ conjugada
12 mesos					Contra el meningococ C conjugada		Triple vírica				
15 mesos						Contra l'hepatitis A			Contra la varicel·la		
3 anys							Triple vírica		Contra la varicel·la		
6 anys	DTPa-PI ¹					Contra l'hepatitis A					
11-12 anys					Contra el meningococ conjugada tetravalent ²	Contra l'hepatitis A ³		Contra el virus del papil·loma humà ⁴	Contra la varicel·la ⁵		
14 anys	Td				Contra el meningococ conjugada tetravalent ²						
Embaras- sades	dTpa ⁶									Contra la grip	
40 anys	Td										
A partir de 60 anys										Contra la grip cada any	
65 anys	Td										Contra el pneumococ 23-valent

¹ S'ha d'administrar la vacuna DTPa-PI als 6 anys d'edat als infants vacunats als 2, 4 i 11 mesos. Els vacunats amb la pauta anterior, als 2, 4, 6 i 18 mesos rebran una dosi de dTpa. ² Vacuna contra el meningococ conjugada tetravalent (MACWY). Es vacunarà els adolescents d'11-12 anys d'edat que no hagin rebut cap dosi de MACWY des dels 10 anys d'edat. També es vacunarà, durant els propers dos anys, els nois i noies de 14 anys als centres educatius i es farà repesca fins als 18 anys d'edat als centres de salut. ³ Vacuna contra l'hepatitis A (HA) i vacuna contra la varicel·la (V). Només es vacunarà als 11-12 anys els infants no vacunats o parcialment vacunats (la pauta vacinal consta de dues dosis). ⁴ Vacuna contra el virus del papil·loma humà (VPH). Es vacinarà només les noies amb dues dosis. ⁵ S'ha d'administrar la vacuna dTpa a les embarassades, en cada embaràs, al més aviat possible a partir de la setmana 27 de gestació.

S'ha actualitzat el calendari vacunal per tal d'incorporar-hi una nova vacuna: la vacuna antimeningocòccica conjugada tetravalent (vacuna MACWY) als 11-12 anys, en substitució de la vacuna contra el meningococ C conjugada (vacuna MC).

Per què s'ha introduït aquesta vacuna?

La vacuna MACWY protegeix contra quatre serogrupos de la malaltia meningocòccica invasiva, malaltia infecciosa greu causada pel bacteri meningococ. D'aquesta malaltia se'n produeixen casos durant tot l'any, però és més freqüent durant els mesos d'hivern i primavera. Existeixen diversos serogrupos, els causants de la malaltia majoritàriament són els serogrupos A, B, C, W i Y, que es transmeten directament a través de les secrecions respiratòries o per contacte directe i perllongat amb una persona portadora. La infecció amb meningococ pot limitar-se a la nasofaringe, sense produir simptomatologia (es parla de portadors asimptomàtics) o progressar i desenvolupar la malaltia (meningitis, bacterièmia o sèpsia, entre d'altres).

Els serogrupos B i C normalment produeixen la malaltia sobretot en infants menors de 5 anys. Actualment, s'ha observat un canvi en el patró epidemiològic amb un increment de casos en els serogrupos W i Y, majoritàriament en els joves, que és la població on es concentra el major estat de portador d'aquest bacteri a la nasofaringe. La vacunació d'aquesta població pretén tenir un efecte directe (protecció de les persones vacunades), i un efecte indirecte en l'àmbit comunitari, és a dir, protegir les persones no vacunades d'altres grups d'edat. Per això és important aconseguir percentatges de vacunació elevats amb l'objectiu de controlar la malaltia.

Com es farà aquesta vacunació?

- *11 i 12 anys (6è de primària)* – se'ls vacunarà als centres educatius, juntament amb la resta de vacunes que s'administren a 6è de primària.
- *13-14 anys (2on ESO)* – durant dos cursos (2019-2020 i 2020-2021) se'ls vacunarà en els centres educatius, juntament amb la vacunació Td.
- *15-18 anys (nascuts entre 2002 i 2005)* – es realitzarà una captació oportunista als centres d'atenció primària durant dos anys.

La pauta de vacunació és una sola dosi de vacuna.

Una vegada hagi finalitzat la campanya, s'establirà la recomanació d'administrar una sola dosi de vacuna MACWY fins als 18 anys d'edat en les persones que no hagin rebut aquesta vacuna sistemàtica als 11-12 anys d'edat.

Les persones que ja hagin rebut la vacuna contra el meningococ C conjugada també s'han de vacunar amb aquesta nova vacuna, ja que així s'ofereix una protecció addicional contra la resta de serogrupos.

Si una persona ja ha rebut anteriorment una dosi de la vacuna MACWY, s'haurà de mirar a quina edat va ser vacunada:

- Els vacunats abans dels 10 anys d'edat hauran de vacunar-se a partir de 6è de primària.
- Els vacunats després dels 10 anys d'edat no s'hauran de tornar a vacunar.

Vacunes disponibles

Hi ha dues vacunes comercialitzades autoritzades:

- Menveo (GSK)
- Nimenrix (Pfizer)