

SALUT INVESTIGACIÓ

L'Aspirina pot reduir el risc de tenir càncer de fetge

Com més temps se'n pren una dosi baixa, més benefici
 || S'han estudiat 50.275 pacients amb hepatitis viral crònica

AGÈNCIES

| MASSACHUSETTS | El consum en baixes dosis d'Aspirina pot ajudar a reduir el risc de càncer de fetge o la mortalitat relacionada per malalties hepàtiques, segons un estudi dut a terme per investigadors de l'Hospital General de Massachusetts, als Estats Units, i que ha estat publicat recentment al *New England Journal of Medicine*. "Les taxes de càncer de fetge i de mortalitat per malaltia hepàtica augmenten a un ritme alarmant als Estats Units i Europa. Malgrat això, no existeixen tractaments establerts per prevenir el desenvolupament de càncer de fetge o per reduir el risc de mort relacionada amb aquest òrgan", van explicar els científics responsables del treball.

Per a l'anàlisi, els investigadors van examinar informació de registres suecs sobre 50.275 adults que tenien hepatitis viral crònica, un tipus d'infec-

LES CLAUS

Tractament

■ L'estudi podria obrir una porta per al tractament per prevenir el desenvolupament de càncer de fetge o per reduir el risc de mort relacionada amb aquest òrgan, amb una taxa de mortalitat que no para d'augmentar.

Resultats

■ Els experts de l'Hospital General de Massachusetts van observar que aquells que havien pres Aspirina tenien un 31 per cent menys de risc de desenvolupar aquest tumor.

ció hepàtica causada pel virus de l'hepatitis B o C i que és el factor de risc més comú per al càncer de fetge.

Durant un seguiment de gairebé vuit anys, el 4 per cent dels pacients que van pren-

dre Aspirina en dosis baixes (menys de 163 mg/dia), enfront del 8,3 per cent dels que no van consumir aquest medicament, van desenvolupar càncer de fetge. A més, els experts van observar que aquells que havien pres Aspirina tenien un 31 per cent menys de risc de desenvolupar aquest tumor.

Ara bé, l'estudi ha mostrat que com més temps pren una persona una dosi baixa d'Aspirina, més gran és el benefici. En comparació amb l'ús a curt termini (3 mesos a 1 any), el risc de càncer de fetge va ser un 10 per cent més baix per cada any o tres anys de consum, un 34 per cent més baix per 3-5 anys i un 43 per cent més baix per 5 o més anys d'ús.

Les morts relacionades amb malalties hepàtiques van donar-se en l'11 per cent de les persones que prenen Aspirina, en comparació amb el 17,9 per cent dels que feia 10 anys que no en prenen.