

Les vacunes són segures

La comunitat científica crida a la tranquil·litat davant de “només” 222 casos de trombes entre 34 milions d'europes vacunats amb AstraZeneca || **Metges demanen anar a l'Arnau només si el mal de cap és intens després d'atendre més pacients “amb por” que amb la Covid**

REDACCIÓ

Uns trenta-quatre milions de persones han estat vacunades contra la Covid-19 a la Unió Europea i el Regne Unit amb AstraZeneca i s'han detectat 222 casos de trombosi. El nombre de casos es considera residual però ha generat alarma entre la població. Està justificada? La comunitat científica i mèdica de Lleida ho té clar: no.

“Tots els medicaments o vacunes tenen efectes secundaris i si llegíssim els dels prospectes, no ens els prendríem”, manifesta el metge i secretari del Col·legi de Metges de Lleida, Daniel Lacasta. “Cada any es produeixen fins a 20.000 hemorràgies per culpa de l'aspirina, però el que està passant amb AstraZeneca és que hi ha hagut massa coincidències, per la qual cosa la gent s'espanta. Tot i així, cal estudiar cada cas de trombosi i basar-se en l'evidència científica, que assegura que els beneficis de la vacuna són més grans que els riscos.” Des de l'entitat col·legial, Lacasta envia un missatge de “tranquil·litat”, ja que “hi ha més risc d'acabar en una UCI per la Covid que per tenir un trombe per la vacuna”.

Malgrat tot, els canvis cons-

tants de criteri a l'administració de la vacuna no hi estan ajudant i dins de la Unió Europea no hi ha un criteri únic a seguir. A Espanya, se n'ha limitat l'ús dels seixanta als seixanta-nou anys i, a Catalunya, ara s'administra als d'entre seixanta i seixanta-cinc anys (més endavant se citaran les persones de seixanta-sis a seixanta-nou). La confusió sobre el límit d'edat i

El risc de vacunar-se respecte al de tenir la Covid greu

Casos en 100.000

TRAM D'EDAT	RISC DE TROMBES RARS PER LA VACUNA	RISC D'INGRES A L'UCI PER COVID
20-29	2	150
30-39	1,5	400
40-49	1	700
50-59	0,8	1.100
60-69	0,5	1.500

FRANGES D'EDAT

Catalunya vacuna amb AstraZeneca persones de 60 a 65 anys i després serà el torn de 66 a 69 anys

els efectes secundaris han provocat que durant els últims tres dies el servei d'Urgències de l'hospital Arnau de Vilanova hagi atès més pacients “pensant” que tenien un trombe que per la Covid.

“La gent té por i venen persones vacunades amb mal de cap”, explica el metge d'Urgències Oriol Yuguero, que assenyala que “en tots els casos, el dolor se n'ha anat amb un paracetamol, per la qual cosa només cal anar a Urgències si el dolor és constant, es tenen nàusees i dificultat per dormir”. Yuguero afirma que divendres al matí van atendre nou persones amb “sospita” de trombe i sis per Covid. Cap tenia un coàgul. “Acabem fent proves que no són necessàries i la por ens farà col·lapsar, però s'ha de transmetre bé la informació a la ciutadania per part de l'Agència Europea del Medicament.” “És pitjor no vacunar-se i la vacuna dolenta és la que no es posa”, sentència.

Fins ara, el 7,15 per cent de la població de Lleida està immunitzada de la Covid i els hospitals no reben pacients greus que estiguin vacunats. Al contrari, han atès malalts amb una dosi i símptomes lleus.

POSSIBLES EFECTES DE LA VACUNA

■ Totes les vacunes aprovades per l'Agència Europea del Medicament són segures i prevenen d'una Covid greu, però com en tots els medicaments o vacunes tenen efectes secundaris.

ASTRAZENECA (EFECTOS DE UNA TROMBOSIS)

- ✗ Dificultat respiratòria
 - ✗ Dolor al pit
 - ✗ Inflor a la cama
 - ✗ Dolor abdominal (ventre) persistent
 - ✗ Síntomes neurològics, que inclouen mals de cap severes i persistents o visió borrosa
- Petites taques de sang sota la pell més enllà del lloc de la injecció

30.462
VACUNATS A LLEIDA
AMB UNA DOSI

PFIZER-BIONTECH

- ✗ Reaccions al lloc de la injecció: dolor, inflor, enrogiment de l'àrea de la punxada

Efectes secundaris generals: sensació de cansament, mal de cap, dolor muscular, calfreds, dolor a les articulacions, febre, nàusees, malestar general, ganglis limfàtics inflamats

50.396
VACUNATS A LLEIDA
AMB UNA DOSI

MODERNA

- ✗ Reaccions al lloc de la injecció: dolor, dolor a la palpació, inflor dels ganglis limfàtics al mateix braç de la injecció, inflor, enduriment i enrogiment de la zona de la punxada.
- ✗ Efectes secundaris generals: fatiga, mal de cap, dolor muscular, dolor articular, esgarrifances, nàusees i vòmits, i febre.

✗ També pot provocar al·lèrgia greu en molt poques ocasions. Els símptomes són: dificultat per respirar, cara i coll inflats, ritme cardíac accelerat, erupció cutània intensa a tot el cos, marejos i debilitat.

3.815
VACUNATS A LLEIDA
AMB UNA DOSI