



Una farmacèutica agafa una capsula de Paxlovid en una farmàcia de Seül (Corea del Sud)

YONHAP / EFE

La UE autoritza la píndola de Pfizer contra la covid

L'antiviral, ja a la venda als EUA, es pren per via oral

BEATRIZ NAVARRO
Brusel·les. Corresponsal

La Unió Europea té una arma més per lluitar contra la pandèmia. L'Agència Europea del Medicament (EMA) va donar ahir llum verda a la comercialització del primer medicament antiviral que s'administra per via oral per combatre la covid i va recomanar a la Comissió Europea i els estats membres que autoritzin formalment el fàrmac Paxlovid.

Els experts de l'EMA han arribat a la conclusió que "els beneficis són més grans que els riscos" i ha recomanat a la Comissió i als estats membres que adoptin una decisió ràpidament per formalitzar l'autorització del medicament. L'antiviral està indicat per a "adults que no necessiten rebre oxigen suplementari i que presenten un risc alt que la malaltia es converteixi en greu", va explicar el regulador europeu en un comunicat.

El comitè de medecines per

a ús humà de l'EMA ha arribat a aquesta conclusió després d'analitzar un estudi amb pacients de covid que mostrava que el Paxlovid redueix significativament la taxa d'hospitalització i mort dels pacients. L'antiviral es va administrar als participants en l'assaig (si fa no fa la meitat va rebre un placebo) cinc dies després del començament dels símptomes de

La pastilla està aconsellada per a pacients amb alt risc de desenvolupar símptomes greus

la malaltia. Un mes després del tractament, només un 0,8% dels pacients que van rebre Paxlovid (8 de 1.039) havien estat hospitalitzats més de 24 hores; en el grup de persones que van rebre un placebo, el percentatge va ser d'un 6,3% (és a dir, 66 de 1.046). Al pri-

mer grup no es va registrar cap mort; al segon n'hi va arribar a haver nou.

Els efectes secundaris del tractament van ser suaus, explica l'EMA, que adverteix, però, que el component principal de l'antiviral, el ritonavir, pot afectar el funcionament d'altres medicaments. Ho assenyalava el prospecte del producte i s'advertirà als professionals sanitaris. Pfizer ha creat un web en què es pot determinar de quina manera interactua amb diferents fàrmacs.

Espanya és un dels països que han fet compres autoritzades d'aquest medicament, que ja està a la venda als Estats Units. El president del Govern, Pedro Sánchez, va anunciar recentment que han adquirit 344.000 tractaments per a aquest any. La major part dels pacients de l'estudi de Pfizer estaven infectats amb la variant delta però, d'acord amb estudis de laboratori, també s'espera que el Paxlovid funcioni contra l'òmicron i contra altres variants.●

UNA NOVA TERÀPIA CONTRA LA COVID

El tractament en pastilles no és per a tothom

Pfizer ha establert que el seu tractament Paxlovid mitjançant pastilles no és per a totes les persones. Ni tan sols es pot administrar a tots els que han contret la covid. El nou medicament està indicat per a pacients adults i adolescents de més de 12 anys que pesin almenys 40 quilos i que tinguin covid lleu o moderada però que per diferents circumstàncies tinguin risc de progressar a un estat greu de la malaltia. És en aquests casos en què el fàrmac ha demostrat efectivitat en proves clíniques.

no pot utilitzar-se com a substitut de la pauta completa de vacunació.

■ **Es pot subministrar a pacients amb covid greu?**
No. Els efectes beneficiosos que el Paxlovid ha demostrat en pacients amb covid lleu o moderada no s'han registrat en els malalts que estaven en estat greu. Els metges han de determinar la seva administració sobre la base que el pacient cursi la malaltia de lleu a moderada i tinguin factors de risc que la puguin agreujar.

■ **Quins són els efectes secundaris de les píndoles?**
Els possibles efectes secundaris que pot causar el Paxlovid i que han estat descrits per Pfizer indiquen que hi pot haver una alteració del sentit del gust, diarrea, pressió arterial alta i dolors musculars. Els estudis clínics també han determinat que aquest medicament pot resultar nociu per al fetge, cosa que pot condicionar la seva utilització en pacients que tinguin afeccions hepàtiques prèvies.

■ **Com es va provar l'ús del Paxlovid?**

Segons Pfizer, el Paxlovid va reduir el risc d'hospitalització i mort quan el tractament es va iniciar els cinc 5 següents del començament dels símptomes. Només 6 dels 607 pacients (1%) que van prendre Paxlovid els 5 dies següents de començar els símptomes van ser hospitalitzats els 28 dies després de començar a prendre les pastilles. Cap no va morir. Per contra, 41 de 612 (6,7%) dels que van prendre un placebo van acabar a l'hospital. D'aquest segon grup, van morir deu pacients.

FRANCESC BRACERO

■ **Què és el Paxlovid?**

El Paxlovid està compost per dos principis actius, el nirmatrelvir, que inhibeix una proteïna del virus SARS-CoV-2 per impedir que el virus es repliqui, i ritonavir, que desaccelera la descomposició del primer. L'acció d'aquest últim permet que el primer es mantingui a l'organisme durant més temps i en concentracions més altes.

■ **Com s'administra?**

Per començar, cal desterrar l'expressió "la pastilla" o "la píndola" de Pfizer, perquè no és una de sola. Es prenen de tres en tres, tal com venen distribuïdes les dosis als blisters. L'administració del Paxlovid al pacient es fa mitjançant tres pastilles. Dues són de nirmatrelvir, i una, de ritonavir. Cal prendre-les juntes per via oral dues vegades al dia durant cinc dies, cosa que suposa un total de 30 pastilles. A partir del cinquè dia, el tractament ha de finalitzar.

■ **Pot prevenir la covid?**

No. Aquest medicament no està prescrit per a un ús preventiu. Pfizer ha especificat que el Paxlovid