

Fàrmacs com Ozempic poden causar pèrdua sobtada de visió en el 0,01% de casos

REDACCIÓ Barcelona

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (Aemps) ha informat sobre el risc que els pacients tractats amb semaglutida pateixin una neuropatia òptica isquèmica anterior no arterítica (Noiana), una reacció adversa "molt infreqüent" que pot causar pèrdua de visió sobtada.

Cal destacar que la semagluti-

da és el principi actiu de medicaments com Ozempic, Rybelsus o Wegovy, utilitzats per al tractament de la diabetis mellitus tipus 2 i l'obesitat, i la seva relació amb aquest efecte secundari ha estat descobert després d'una revisió duta a terme pel Comitè per a l'Avaluació de Riscos en Farmacovigilància (PRAC) de l'Agència Europea del Medicament (EMA, per les sigles en anglès).

Durant l'anàlisi s'han avaluat les dades d'assajos clínics i pre-

clínic, així com les notificacions de sospites de reaccions adverses i de la bibliografia científica, i s'ha arribat a la conclusió que el tractament amb semaglutida en adults amb diabetis tipus 2 augmenta dues vegades el risc de patir aquesta afecció, que pot afectar una de cada 10.000 persones cada any.

Tot i això, no s'ha aconseguit establir un interval de temps per al desenvolupament d'aquesta patologia després de l'inici del tractament. Aquestes conclusions ara les haurà de ratificar el Comitè de Medicaments d'Ús Humà (CHMP) de l'EMA, i després s'actualitzarà la fitxa tècnica i el prospecte d'aquests medicaments per reflectir aquesta nova informació.

L'Aemps ha recomanat con-

PREVENCIÓ

Revisions a partir dels 50 contra el càncer de pròstata

■ El Grup d'Oncologia Genitourinària va recordar ahir que les revisions a partir dels 50 anys són clau en la detecció precoç del càncer de pròstata, el tumor més freqüent entre els diagnosticats en homes i el responsable actualment del 10% de les morts per càncer. S'estima que aquest any se'n diagnosticaran uns 32.188 nous casos.

sultar immediatament un metge en cas que s'experimenti pèrdua sobtada o empitjorament ràpid de la visió, ja que aleshores es podria fer un examen oftalmològic i fins i tot suspendre el tractament.

El 2017 l'FDA, l'organisme que regula els fàrmacs als EUA, va aprovar l'ús de la semaglutida, el popular Ozempic, pensat per a la diabetis. Aviat es va convertir en una solució miraculosa al sobrepès perquè aconseguia reduir el desig desmesurat pel menjar. Aconseguia pèrdues de pes de fins al 15% en 68 setmanes. Va ser el primer d'una sèrie de medicaments que, per primera vegada, són eficaços contra l'obesitat, tot i que noves investigacions també n'estan documentant els riscos.●